

CALENDRIER RÉGULIER D'IMMUNISATION DU NUNAVIK (MAJ 2026-08-17)

Âge	Antigènes à administrer				Produits immunisants suggérés, Par noms commerciaux et leurs équivalents
À la naissance	Ac-VRS* (1)				Nirsévimab (Beyfortus)
1 mois	BCG (2)				BCG Japan
2 mois	DCaT- HB - VPI - Hib	Pneu-C-20	Rota (3)		Infanrix hexa / Prevnar20 / RotaTaq ou Rotarix
4 mois	DCaT- HB - VPI - Hib	Pneu-C-20	Rota (3)		Infanrix hexa / Prevnar20 / RotaTaq ou Rotarix
6 mois (4 - 5)		Pneu-C-20		Influenza (6)	Prevnar20
1 an (7)	DCaT-VPI - Hib	Pneu-C-20	RRO-Var	Influenza (6)	Infanrix-IPV/Hib ou Pentacel / Prevnar20 / Proquad ou Priorix-Tetra
18 mois	HA-HB	Men-C-ACWY	RRO-Var	Influenza (6)	Twinrix Jr / Nimenrix ou Menveo / Proquad ou Priorix-Tetra
4 à 6 ans (8)	dcaT- VPI		+ mise à jour du statut vaccinal	Influenza (6) HA (9)	Adacel-Polio ou Boostrix-Polio
4 ^e année	VPH-9	HA (9)		Influenza (6)	Gardasil 9 / Havrix (720 U) ou Vaqta (25 U)
Secondaire 0 (10)	dT (11)	Men-C-ACWY (12)	+ mise à jour du statut vaccinal	Influenza (6) HA (9)	dT adsorbées / Engerix B (0,5 mL) ou Recombivax HB (0,5 mL) / Nimenrix ou Menveo
Femme enceinte	dcaT (13)			Influenza (6) HA (9)	Adacel ou Boostrix
50 ans (14)	dT (11 - 15)	Pneu-C-20 (16)	+ mise à jour du statut vaccinal	Influenza (6) HA (9)	dT adsorbées / Prevnar20
71 ans	Zona-SU (17)			Influenza (6)	Shingrix

Notes:

*Bien que l'Ac-VRS ne soit pas un vaccin, il est inclus dans le calendrier régulier de vaccination des nourrissons.

1. Anticorps monoclonal à administrer le plus tôt possible après la naissance (en saison du VRS).
2. Administrer le BCG aux enfants de moins de 24 mois du Nunavik si résultat négatif au dépistage du DICS.
3. La vaccination contre le rotavirus doit être débutée avant l'âge de 20 semaines et complétée avant l'âge de 8 mois. Pour les enfants immunodéprimés ou susceptibles de l'être, les enfants avec antécédents d'invagination intestinale ou ceux présentant des symptômes de gastroentérites aiguës : référer au PIQ.
4. Une dose additionnelle de DCaT-VPI-Hib est administrée à 6 mois pour les enfants immunodéprimés, prématurés (< 32 semaines), de très faible poids de naissance (<1500g), présentant une asplénie anatomique ou fonctionnelle ou un implant cochléaire (Voir PIQ).
5. Une dose additionnelle de Pneu-C-20 est offerte à 6 mois au Nunavik. Si cette dose est omise, elle peut être rattrapée jusqu'à l'âge de 11 mois.
6. Le vaccin contre l'influenza est recommandé annuellement durant la saison grippale à toute personne vivant dans les communautés éloignées/ isolées, dès l'âge de 6 mois. Chez l'enfant de moins de 9 ans, 2 doses sont requises à 4 semaines d'intervalle s'il s'agit de la 1^{ère} année où l'enfant reçoit le vaccin.
7. Administrer DCaT-VPI-Hib, Pneu-C-20, RRO-Var le jour du 1^{er} anniversaire ou le plus tôt possible après.
8. Mise à jour du statut vaccinal : Administrer une dose de Pneu-C-20 aux enfants de moins de 5 ans qui n'ont jamais reçu de Pneu-C-20.
9. Au Nunavik, la vaccination contre l'hépatite A est recommandée pour toute personne de 18 mois et plus non-adequatement protégée. Une personne est considérée adéquatement protégée si elle a reçu 1 dose entre 1 et 19 ans, OU 2 doses si la vaccination a débuté à l'âge de 20 ans ou plus (avec un intervalle de 6 à 12 mois). Compléter la vaccination si nécessaire. La dose prévue en 4^e année peut être omise si au moins 1 dose du vaccin contre l'hépatite A a été reçue après l'âge de 1 an.

10. Les vaccins prévus en 3^{ème} secondaire dans le PIQ sont donnés en secondaire 0 au Nunavik.
11. Si le vaccin dT n'est pas disponible, il est possible d'utiliser le vaccin dcaT, même si la composante coqueluche n'est pas requise pour la protection.
12. Omettre cette dose si 1 dose de Men-C-ACWY a été administrée à l'âge de 10 ans ou plus.
13. Vacciner les femmes enceintes contre la coqueluche à chaque grossesse, peu importe les antécédents vaccinaux. Vacciner de préférence entre 26 et 32 semaines de gestation.
14. Pour les bénéficiaires de la CBJNQ âgés de 50 à 70 ans, les frais de vaccination contre le zona sont couverts par le programme SSNA selon critères du programme (se référer à l'algorithme « Vaccination contre le zona » de la RRSSN pour les détails d'admissibilité).
15. Omettre cette dose si une dose de dT a été administrée depuis l'âge de 40 ans.
16. Administrer 1 dose de vaccin Pneu-C-20 aux personnes de 50 ans et plus vivant au Nunavik. Un intervalle minimal d'un an doit être respecté entre tout vaccin Pneu-C ou Pneu-P et l'administration du Pneu-C-20.
17. Le calendrier recommandé pour la vaccination contre le zona comprend 2 doses, données à un intervalle recommandé de 2 à 12 mois.

ATTENTION! Ce calendrier n'inclut pas les recommandations spécifiques s'adressant à une clientèle immunodéprimée, asplénique, vivant avec des conditions médicales ou facteur(s) de risque particulier(s) (ex : maladies chroniques, itinérance, utilisation de drogues dures, harsah, etc.). Vous devez vous référer au PIQ pour des recommandations vaccinales adaptées à cette clientèle et suivre les calendriers spécifiques lorsque applicable.