

6. Y A-T-IL UN RISQUE À ADMINISTRER LE BCG À UN ENFANT DÉJÀ INFECTÉ PAR LA TB ?


Non, il n’y a pas de risque à administrer le vaccin BCG à un enfant qui serait déjà infecté par la TB. Cependant, l’intervention à prioriser dans ce contexte est le début d’un traitement antituberculeux, avant d’envisager la vaccination avec le BCG.

ADMINISTRATION DU VACCIN BCG

7. QUELLES SONT LES PARTICULARITÉS DE L’ADMINISTRATION DU VACCIN BCG ?

Le vaccin BCG est un vaccin vivant atténué administré par voie intradermique. Le site recommandé pour ce vaccin est le tiers supérieur du bras. Une dose unique de 0,05 mL est recommandée pour les bébés de moins d’un an, et de 0,1 mL pour les bébés d’un an et plus.

Il peut être administré dès la réception d’un résultat négatif au dépistage DICS. D’autres précautions et contre-indications s’appliquent à la vaccination avec le BCG, telles que décrites dans le PIQ.




8. QUELLES SONT LES INTERVALLES À RESPECTER CONCERNANT LA VACCINATION BCG ?

INTERVALLES

| | |
|--|--|
| VACCIN VIVANT ATTÉNUÉ | Le BCG peut être administré le même jour qu’un autre vaccin vivant atténué injectable, ou à au moins 4 semaines d’intervalle. Les vaccins vivants administrés par voie orale ou intranasal (ex : vaccin contre le rotavirus ou vaccin intranasal contre l’influenza) peuvent être administrés en même temps que le vaccin BCG, ou à n’importe quel autre moment avant ou après. |
| TRAITEMENT ANTITUBERCULEUX | Le BCG ne devrait pas être administré aux personnes qui prennent des médicaments antituberculeux, parce que ceux-ci peuvent inactiver le bacille du vaccin. |
| TCT | Le TCT peut être effectué le même jour qu’un autre vaccin vivant atténué injectable, ou à au moins 4 semaines d’intervalle, car ce dernier peut diminuer la réactivité à la tuberculine. Cependant, il peut être effectué en même temps que des vaccins inactivés ou vivants atténués administrés par voie orale, ou encore n’importe quand avant ou après. |
| PRODUITS SANGUINS ET IMMUNOGLOBULINES | Le BCG peut être administré en même temps que des immunoglobulines ou d’autres produits sanguins ou n’importe quand avant ou après (incluant également l’Ac-VRS). |

Pour les enfants sous prophylaxie fenêtrée, sous traitement d’une TB latente, ou traités pour TB active, attendre la fin de la médication antituberculeuse puis offrir la vaccination BCG aux enfants toujours sous l’âge de 24 mois.

9. QUELLE EST LA PROGRESSION NORMALE DE LA PEAU DU SITE VACCINAL SUIVANT L’INJECTION ID DE BCG ?



Ces effets sont considérés comme normaux et n’ont pas à être déclarés comme une MCI.